

Beschäftigung mit den andern Ordnungen würde auch in diesem wichtigsten Theile der Insectenkunde zu neuen und interessanten Beobachtungen und Entdeckungen führen, daran ist kein Zweifel.

Dann, aber auch nur dann, wenn dieser Weg eingeschlagen und der junge Nachwuchs von Entomophilen durch die ältern auf die bisher vernachlässigten Ordnungen angelernt wird, steht zu hoffen, dass für sie auch ein eignes Organ sich finden und sich erhalten wird. Bis dahin werden die wenigen, vereinzelt Hymenopterologen, Hemipterologen etc. so verständig und genügsam sein müssen, es den Redactionen der entomol. Zeitschriften nicht zu verargen, wenn sie auf die 90 oder mehr Procent ihrer Leser billige und nöthige Rücksicht wegen der zwei bevorzugten Ordnungen nehmen, und die unbeliebten nur gelegentlich zum Worte verstatten. Wenigstens kann ich als Redacteur der *Linnæa entomologica* die Thatsache behaupten und beweisen, dass der Verleger der ersten 12 Bände nach seiner glaubwürdigen Versicherung niemals durch die letzten 10 Bände den Schaden gutmachen konnte, den ihm die langen dipterischen Artikel in den beiden ersten gethan hatten. Und doch war H. Loew anerkannt der erste Meister in seinem Fache!

Ceterum quidem censeo, meine geehrten Herren Collegen, sorgen Sie für den unerlasslichen Nachwuchs!

---

## Nachtrag zur Schmetterlings-Fauna von Kissingen.

---

Dass das von mir im Anfange d. J. publicirte Verzeichniss der bei Kissingen vorkommenden Schmetterlings-Arten ein sehr unvollständiges sein würde, liess sich bei meiner kurzen Anwesenheit daselbst und dazu noch in einem kalten, regnerischen Frühjahr wohl kaum anders erwarten. Ich hatte Anfangs die Absicht, im Juli d. J. den Kurort wieder zu besuchen, um meine daselbst begonnenen Beobachtungen fortzusetzen, wurde aber meinem Vorsatze später untreu und zog vor, nach Pontresina und Bergün zu gehen, um dort der Schmetterlings-Jagd obzuliegen. Trotzdem bin ich doch in der Lage, einige weitere Mittheilungen über die Lepidopteren-Fauna Kissingens machen zu können. Die Freundlichkeit des Herrn Regierungsrath Heydenreich in Osnabrück, welcher mehrere Jahre hintereinander in der schönen Umgegend der Rakoczy-Quelle und

zwar in verschiedenen Monaten eifrig gesammelt, hat mich in den Stand gesetzt, das früher von mir gegebene Verzeichniss um folgende Arten vermehren zu können:

1) *Colias Edusa* Fabr. 2) *Thecla Ilicis* Esp. 3) *Polyomm. Virgaureae* L. 4) *Polyomm. Hipponoe* Esp. 5) *Lycaena Corydon* Bsdv. 6) *Lycaena Meleager* Esp. *Daphnis* SV. 7) *Lycaena Damon* SV. 8) *Apatura Iris* L. 9) *Apatura Ilia* SV. 10) *Apatura Clytie* SV. 11) *Lim. Populi* L. 12) *Lim. Sibylla* L. 13) *Melitaea Didyma* O. 14) *Melitaea Dictynna* Esp. 15) *Melitaea Aurelia* Nick. 16) *Arg. Dia* L. 17) *Arg. Aglaja* L. 18) *Arg. Adippe* L. 19) *Arg. Paphia* L. 20) *Melan. Galathea* L. 21) *Sat. Hermione* L. 22) *Sat. Circe* Fabr. 23) *Sat. Semele* L. 24) *Pararge Adrasta* Hübn. 25) *Pararge Dejanira* L. 26) *Coen. Iphis* SV. 27) *Syricht. Alveus* Hübn. 28) *Deil. Euphorbiae* L. 29) *Chaeroc. Porcellus* L. 30) *Troch. apiforme* Esp. 31) *Sesia empiformis* Esp. 32) *Ino Pruni* SV. 33) *Ino Statice* L. 34) *Zyg. Minos* SV. 35) *Zyg. Meliloti* Esp. 36) *Zyg. Lonicerae* Esp. 37) *Zyg. Angelicae* O. 38) *Zyg. Peucedani* Esp. 39) *Zyg. Carniolica* v. *Hedysari* Hübn. 40) *Sarroth. revayana* v. *undulana* Hübn. 41) *Lith. complana* L. 42) *Nola confusalis* HS. 43) *Setina irrorella* Clerk. 44) *Nem. plantaginis* L. et var. *Hospita* SV. 45) *Arctia purpurea* L. 46) *Spilosoma fuliginosa* L. 47) *Psilura Monacha* L. 48) *Bomb. Crataegi* L. 49) *Bomb. Rimicola* SV. *Catax* Esp. 50) *Bomb. Rubi* L. 51) *Lasioc. quercifolia* L. 52) *Lasioc. ilicifolia* L. 53) *Aglia tau* L. 54) *Hyboc. Milhauseri* Fabr. 55) *Notod. trepida* Esp. 56) *Notod. Chaonia* SV. 57) *Notod. Querna* SV. 58) *Notod. Argentina* SV. 59) *Drynobia Melagone* Bkh. 60) *Cymatoph. Bipuncta* Bkh. 61) *Asphalia ridens* Fabr. *xanthoceros* Hübn. 62) *Acron. auricoma* SV. 63) *Acron. euphorbiae* SV. 64) *Triphaena subsequa* SV. 65) *Agrotis exclamationis* L. 66) *Agrotis tritici* L. 67) *Mamestra thalassina* Hufn. 68) *Char. culta* SV. 69) *Hadena latruncula* SV. 70) *Cloantha perspicillaris* L. 71) *Leuc. conigera* SV. 72) *Grammesia trilinea* SV. 73) *Amph. pyramidea* L. 74) *Taenioc. gothica* L. 75) *Taenioc. instabilis* SV. 76) *Hoporina croceago* SV. 77) *Caloc. exoleta* L. 78) *Xylina rhizolitha* Fb. 79) *Xylomiges conspicillaris* L. 80) *Asteroscopus cassinea* SV. 81) *Cucullia umbratica* L. 82) *Cucullia lactueae* SV. 83) *Chariclea marginata* Fh. 84) *Prothymia aenea* SV. 85) *Ophiodes lunaris* SV. 86) *Catoc. fraxini* L. 87) *Catoc. sponsa* L. 88) *Toxoc. pastinum* Tr. 89) *Aventia flexula* SV. 90) *Zanclog. tarsiplumalis* Hübn. 91) *Zanclog. grisealis* SV. 92) *Madopa salicalis* SV. 93) *Herm. derivalis* Hübn. 94) *Pechip.*

barbalis Clerk. 95) *Brephos notha* Hübn. 96) *Thalera fimbrialis* Scop. 97) *Pell. vibicaria* Clerk. 98) *Bapta pictaria* Curt. 99) *Ellopiea faseiaria* SV. 100) *Metroc. margaritaria* L. 101) *Selenia lunaria* SV. 102) *Ang. prunaria* L. 103) *Rumia crataegata* L. 104) *Epione parallelaria* SV. 105) *Macaria liturata* Clerk. 106) *Ploseria diversata* SV. 107) *Biston hirtaria* SV. 108) *Boarmia consortaria* Fh. 109) *Scotosia badiata* SV. 110) *Cid. fulvata* Först. 111) *Cid. montanata* SV. 112) *Cid. albicillata* L. 113) *Cid. tristata* L. 114) *Cid. derivata* SV. 115) *Eup. rectangulata* L. 116) *Eup. isogrammaria* HS. 117) *Euploc. anthracinalis* Scop. 118) *Hypere. citrinalis* Scop.

Vorstehende Arten wurden theils als Raupen, theils als entwickelte Lepidoptern gefunden. Notizen über Fundstellen, Erscheinungszeit, grössere oder geringere Häufigkeit, hat Herr Heydenreich an Ort und Stelle sich nicht gemacht und ist deshalb nicht in der Lage gewesen, mir hierüber ausführliche Mittheilungen zu machen. Das, was er mir darüber geschrieben, besteht hauptsächlich in Folgendem:

Lim. *Populi* fliegt an ruhigen, sonnigen Tagen bis 11 Uhr Morgens massenhaft auf der Chaussee nach Clausdorf. Die *Apatura*-Arten kommen sehr häufig vor. Die Raupen von *Melit. didyma* wurden ebenfalls sehr zahlreich gefunden. *Troch. apiforme* sass vielfach an den Balsam-Pappeln der Brunnenpromenade nach der Mühle. Die Raupen von *Zyg. carniolica* fanden sich häufig an *Esparsett*. *Madopa salicalis* und *E. parallellaria* wurden in dem Zitterpappel-Gebüsch über der Schützen-Halle gefunden, letztere Art auch auf dem Altenberge. Von den Buscheichen unterhalb der Hohen-Eich an dem Abhange nach der Schützen-Halle wurden die Raupen von *Oph. lunaris* in Masse geklopft, auch waren dort in Mehrzahl zu finden die Raupen von: *N. Chaonia*, *trepida*, *Argentina*, *Nol. confusalis*, *Xyl. rhizolitha*, *Hop. croceago*. Raupen von *Ap. Ilia*, *Clytie* und *Iris* wurden ebenfalls in Mehrzahl gesammelt, hauptsächlich in der Umgebung einer Bergwiese oben im Staffelswalde. An *Populus tremula* fand Herr Heydenreich eine Anzahl *Vanessa*-Raupen, die er für *Polychloros* hielt und deshalb nicht mitnahm, von denen er aber später, des Futters wegen, vermuthete, dass es *V. L-album* gewesen sei. Als diese Vermuthung in ihm auftauchte, war es zu spät, sich von deren Richtigkeit zu überzeugen. Nach Staudinger's Catalog soll *L-album* in Süd- und Mitteldeutschland fliegen. Es wäre daher wohl möglich, dass es *L-album* gewesen sei.

Elberfeld, im October 1880.

P. Maassen.